


# Certis Belchim paleta za krumpir

Pripravci po namjeni i vremenu uporabe



Detaljnije informacije na: [www.certisbelchim.hr](http://www.certisbelchim.hr)




**STRUČNO TEHNIČKA PODRŠKA:**

**Dragić Dario:** 099 7019 981 - [Dario.Dragic@certisbelchim.com](mailto:Dario.Dragic@certisbelchim.com)  
**Hafner Vasja:** 091 416 6555 - [Vasja.Hafner@certisbelchim.com](mailto:Vasja.Hafner@certisbelchim.com)  
**Jindra Čupić Dunja:** 099 5270 975 - [Dunja.Jindra@certisbelchim.com](mailto:Dunja.Jindra@certisbelchim.com)  
**Matić Ante:** 098 416 755 - [Ante.Matic@certisbelchim.com](mailto:Ante.Matic@certisbelchim.com)  
**Saić Nikola:** 099 2632157 - [Nikola.Saic@certisbelchim.com](mailto:Nikola.Saic@certisbelchim.com)  
**Uljević Pavao:** 091 4444 057 - [Pavao.Uljevic@certisbelchim.com](mailto:Pavao.Uljevic@certisbelchim.com)  
**Varga Milenko:** 091 57 10 650 - [Milenko.Varga@certisbelchim.com](mailto:Milenko.Varga@certisbelchim.com)  
**Vrtarić Marko:** 099 71 27 089 - [Marko.Vrtaric@certisbelchim.com](mailto:Marko.Vrtaric@certisbelchim.com)

# KRUMPIR

Certis Belchim preporuke

**Certis Belchim** nudi kompletnu paletu za suzbijanje bolesti krumpira (plamenjača, koncentrična pjegavost, bijela noga), suzbijanje korova, desikaciju, suzbijanje puževa i folijarna gnojiva za optimizaciju opskrbe sa dušikom i fosforom.



**Certis Belchim POTATOPRO™**  
 Pouzdanost i profesionalnost u proizvodnji krumpira

Certis Belchim HR d.o.o.  
 Oreškovićeve ulica 1A  
 10000 Zagreb  
[www.certisbelchim.hr](http://www.certisbelchim.hr)







DESIKACIJA, KOROVI



PLAMENJAČA



Izbor osnovnog zemljišnog herbicida

Dodajemo partnere: širi spektar, povećana učinkovitost

Nesmetan razvoj krumpira

# Proman

Osnovni zemljišni herbicid širokog spektra djelovanja, dobre perzistentnosti, s pouzdanim djelovanjem u različitim vremenskim i zemljišnim uvjetima i na ambroziju.

Izbor partnera ovisi o očekivanoj zakorovljenosti, vremenskim uvjetima, intenzitetu proizvodnje krumpira i stanju tla.

**PROMAN sam:** do 4 L/ha  
(manja zakorovljenost ili dominacija korova osjetljivih sepecifično na PROMAN, npr. ambrozija)

**2 djelatne tvari**  
PROMAN 2,5-3,5 L/ha + CHANON 2 L/ha ili  
PROMAN 2,5-3,5 L/ha + CLEMATIS 0,2-0,25 L/ha


**3 djelatne tvari, premium rješenje**  
PROMAN 2-3 L/ha + CHANON 2 L/ha + CLEMATIS 0,2 L/ha

### SUZBIJANJE USKOLISNIH KOROVA TOKOM VEGETACIJE

- **FUSILADE MAX:** 0,5-2 L/ha (veće doze za višegodišnje trave i li kasnije faze)

### DESIKACIJA

- **MIZUKI:** 2 L/ha (1-2 prskanja) ili
- **BELOUKHA** (odlična ekološka svojstva): 16L/ha popreko ili 6-8 L/ha u redovima (po vrhovima grebena), sama ili zajedno sa MIZUKIJEM



- **3 razdoblja razvoja nasada krumpira zahtijevaju 3 različita pristupa!**
- **4. razdoblje: zaključna prskanja za zaštitu gomolja.**
- **Kombinacije nude optimalnu zaštitu tijekom preporučenog razdoblja!**
- **SPORAX: Maksimalna kurativnost i sistemčnost za list i stabljiku!**
- **CYMBAL FLOW: odlična kurativnost, krtko preventivno djelovanje.**
- **RANMAN TOP, SHIRLAN: Odlično preventivno djelovanje, najbolja rješenja za zaštitu gomolja.**

### DOZIRANJE

- **SHIRLAN sam:** 0,4 L/ha ili SHIRLAN 0,3 L/ha + SPORAX 1,2 L/ha (SHIRLAN najbolje djeluje kod niskih temperatura, zbog toga da se koristi u ranim fazama)
- **Maksimalna kurativnost:** SPORAX 1,1-1,4 L/ha + CYMBAL FLOW 0,4-0,5 L/ha (Kombinacija za najopasnije situacije, maksimalna moguća kurativnost.)
- **RANMAN TOP sam:** 0,5 L/ha ili SPORAX 1,2 L/ha + RANMAN TOP 0,4 L/ha (RANMAN TOP: odlična preventiva pa i zaštita novog rasta u svim vremenskim uvjetima.)
- **Zaštita gomolja:** RANMAN TOP 0,5 L/ha ili SHIRLAN 0,4 L/ha (RANMAN TOP i SHIRLAN prepoznati su kao daleko najbolji za zaštitu gomolja na kraju sezone.)
- **Odlična formulacija hidroksidnog + oksikloridnog tekućeg bakra:** AIRONE 2,8 L/ha

### SUZBIJANJE BIJELE NOGE

- **TRETIRANJE SAMO GOMOLJA:**  
MONCUT: 0,2 L/t gomolja (tretiranje sa dozatorima na vrtljivim trakama)
- **TRETIRANJE GOMOLJA I TLA:**
  - MONCUT: 0,2 L/t gomolja (tretiranje sa dozatorima na vrtljivim trakama) +
  - ZAFTRA: 1-2 L/ha (prskanje u brazdu u vrijeme sadnje vodeći računa da sam gomolj ostane netretiran)

### SUZBIJANJE KONCENTRIČNE PJEGAVOSTI (Alternaria spp)

- **Alterniranje fungicidima NARITA i ZAFTRA,** prvo prskanje: NARITA.
- NARITA se u program uključuje na kraju intenzivnog rasta lisne mase, na početku cvatnje:
  - Kurativna situacija: 0,5 L/ha ili
  - Preventivna situacija: 0,25 L/ha (pri ovoj dozi interval nikada ne smije biti dulji od 10 dana)
- ZAFTRA: uz difenokonazol (NARITA) najbolji fungicid za suzbijanje koncentrične pjegavosti krumpira. ZAFTRA prvenstveno djeluje preventivno. ZAFTRA također ima i solidno djelovanje na plamenjaču krumpira.
  - Doza: 0,5 L/ha

### LIMACID JEDINSTVENE FORMULACIJE



- Maksimalna primamljivost
- Najukusnija peleta
- Limacid najbržeg djelovanja
- Najduže djelovanje... i u kišnim uvjetima
- Optimalno i ravnomjerno rasipanje

### DOZIRANJE

- najviše 5 kg/ha po aplikaciji,
- ukupno najviše 17,5 kg/ha u sezoni

### MULTIFUNKCIONALNI ADJUVANT



- Povećava zadržavanje SZB na biljci.
- Sprječava odbijanje kapljica od biljaka. Omogućuje optimalno širenje kapljica.
- Izuzetno snažno lijepi sredstva na biljke što sprječava ispiranje kišom.

STICMAN omogućuje manji broj prskanja u kišovitim uvjetima, povećava učinkovitost sredstava a doze SZB mogu se smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama. **Doziranje** (krumpir): 0,1-0,15 L/ha

### FOLIJARNA PRIHRANA DUŠIKOM, FOSFOROM I MIKRO ELEMENTIMA

- Folijarna prehrana je puno preciznija od prihrane standardnim zemljišnim gnojivima. Ne ovisi od vremenskih i zemljišnih uvjeta (kiša, suša, sorpcija u tlu, ...), stvarni unos apliciranih hranjiva je praktički blizu 100%.
- **AZO-SPEED:** sadrži brzo i dugotrajno dostupni dušik, magnezij i sumpor.
    - Može se miješati sa SZB i potiče njihovo djelovanje.
    - UPORABA: 10-20 L/ha (prije formiranja gomolja i na početku cvatnje)
  - **STARMAX Zn:** sadrži fosfor, kalij i cink. Glavna namjena je optimalan razvoj korijenskog sustava.
    - Može se miješati sa SZB.
    - UPORABA: 2-4 L/ha (1 aplikacija kada je lišće dobro razvijeno. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.)

Rhizoctonia



Alternaria spp



PUŽEVI



ADJUVANT



PRIHRANA

