





## SUZBIJANJE KOROVA

CERTIS BELCHIM nudi najkompletniji neglifosatni izbor pripravaka za suzbijanje korova u maslini. MIZUKI, BELOUKHA i FUSILADE MAX isključivo folijarni su herbicidi dok ima CHIKARA i dugotrajno djelovanje preko tla. Za cjelovitu kontrolu korova najbolje je koristiti kombinacije:

- **CHIKARA 160 g/ha\* + MIZUKI 1-2 L/ha\*** kad korovi imaju do/oko 10 cm **izuzetno djelovanje i preko korijena i folijarno!**
- **CHIKARA 160 g/ha\* + BELOUKHA 16 L/ha\*** kad korovi imaju do/oko 10 cm
- **Odlično djelovanje preko korjena i dopunsko folijarno djelovanje. BELOUKHA ima izuzetno povoljna ekološka svojstva, ne ostavlja nikakvih metabolita i rezidua.**

\*Doze su za neto poprskane površine, prskanjem u trake doze na hektar maslinika su ¼ do ½ navedenih doza.

**FUSILADE MAX:** folijarni herbicid za suzbijanje uskolisnih korova (npr. zubača)

## ODSTRANJIVANJE IZDANKA

Izdanci predstavljaju neproduktivan dio masline koji može biti izvor zaraza sa bolestima, koji neproduktivno koristi hranjiva i oslabljuje gajenu biljku.

### MIZUKI® PRIMJENA

Doza je 2 L/ha\*. Prije nego odrveni osnova izdanka, do najviše 15 cm dužine. Preporučuje se upotreba štitnika.

### Beloukha® PRIMJENA

Doza je 16 L/ha\*. Prije nego odrveni osnova izdanka, do najviše 15 cm dužine. Preporučuje se upotreba štitnika.

\* Navedene doze su za neto poprskanu površinu uz utrošak vode 150-400 L/ha. Jer se prska u redove je doza na hektar maslinika ¼ do ½ od navedenih doza!



MASLINOV MOLJAC

## SCATTO® SUZBIJANJE ŠTETNIKA

### Maslinov moljac (*Prays oleae*)

0,3-0,42 L/ha na početku cvatnje (BBCH 62) za prvu generaciju ili 0,5 L/ha za drugu generaciju odmah nakon zametanje plodova do bojanja plodova (BBCH 81).

### Maslinina muha (*Bactrocera oleae*)

0,5 L/ha kod pojave štetnika od početka razvoja plodova do pune zrelosti plodova (BBCH 71-89).

### Maslinina buha (*Euphyllura olivina*)

0,3-0,5 L/ha kod pojave štetnika od početka cvatnje do bojanja plodova (BBCH 62-81).

### Maslinov medić (*Saissetia oleae*)

0,5 L/ha kod pojave štetnika od kraja cvatnje do pune zrelosti plodova (BBCH 69-89).



MASLININA MUHA



MASLININA BUHA



MASLINOV MEDIĆ

## Airone® SC SUZBIJANJE BOLESTI BAKROM



### Potpuno drugačiji bakar. Patentirana formulacija iznimne učinkovitosti i udobne uporabe.

AIRONE SC je patentirana tekuća formulacija na osnovi bakra:

- Sadrži dva oblika bakra
  - Bakarni hidroksid - **brzo inicijalno djelovanje**
  - Bakarni oksiklorid - **produženo djelovanje**
- U usporedbi s drugim bakarnim pripravcima sadrži čestice ujednačenije veličine, te ima puno više čestica manjih od 1 µ što je osnova za:
  - Brzo i ravnomjerno dispergiranje
  - Smanjeno ispiranje kišom
  - Manje doze za punu činkovitost
- **Dozvoljena primjena u ekološkoj proizvodnji!**

### PREPORUKA

Za suzbijanje paunovog oka (*Spilocaea oleaginea*), olovne bolesti (*Pseudocercospora cladosporioides*) i raka (*Pseudomonas savastanoi*) u dozi od 2,1 L/ha. Primjenjuje se najviše dva puta godišnje, uz razmak od 14 dana između primjena.



1, 2, 3 ...

- 1 - brzo dispergiranje
- 2 - tekuća formulacija,
- 3 - jednostavno rukovanje ...

PAUNOVO OKO



OLOVNA BOLEST



BAKTERIJSKI RAK



## FOLIJARNA PRIHRANA DUŠIKOM, BOROM I MIKRO ELEMENTIMA

**AZO-SPEED:** brzo i dugotrajno dostupni dušik, magnezij i sumpor.

- UPORABA (može se miješati sa SZB): 5-10 L/ha
  - 1 primjena prije cvatnje
  - 1 primjena nakon berbe

**BORACTIV:** bor, molibden, dušik, magnezij i sumpor.

- **Dozvoljena primjena u ekološkoj proizvodnji!**
- UPORABA (može se miješati sa SZB): 2,5 L/ha (maksimalna koncentracija 1,5%):
  - 3 primjene prije cvatnje,
  - 1 primjena nakon cvatnje.

FOLIJARNA PRIHRANA

